







## Quelques plantes .... au fil des saisons

	<p><b>Mouron délicat</b> <i>Anagallis tenella</i>  <b>Bog Pimpernel</b>            Fleurs rose tendre à veines plus foncées.            Mai à septembre. Régions marécageuses, tourbières, prairies mouillées.</p>
	<p><b>Cirse des ruisseaux</b> <i>Cirsium rivulare</i>  <b>Brook Thistle</b>            Feuilles vertes à peine piquantes, fleurs pourprées.            Juin - Août.            Assez commun. Prés humides, marécages ; sur silice.</p>
	<p><b>Droséra à feuilles rondes</b> <i>Drosera rotundifolia</i>  <b>Round-leaved Sundew</b>            Feuilles en rosette au sol d'où sort la hampe florale aux pétales d'un blanc pur. Plante carnivore. Espèce protégée.            Juin-Septembre.            Tourbières.</p>
	<p><b>Euphorbe anguleuse</b> <i>Euphorbia angulata</i>  <b>Spurge</b>            Fleurs d'abord jaunes puis plus ou moins rougeâtres ou purpurines.            Mai-Juin.            Bois, landes. Assez rare : Sud-Ouest.</p>
	<p><b>Gaillet boréal</b> <i>Galium boreale</i>  <b>Northern Bedstraw</b>            Inflorescence en ombelle terminale, avec fleurs blanches.            Mai-Août.            Prés marécageux, bois clairs ; préférence calcaire.</p>
	<p><b>Laïche filiforme</b> <i>Carex lasiocarpa</i>  <b>Slender Sedge or Wood Fruited Sedge</b>            Mai-Juillet.            Marais tourbeux alcalins profonds ou en bord d'étangs tourbeux; jusqu'à 400 m d'altitude.</p>
	<p><b>Gentiane des marais</b> <i>Gentiana pneumonanthe</i>  <b>Marsh gentian</b>            Grandes fleurs bleues, solitaires à l'aisselle des feuilles.            Juillet-Octobre.            Prairies marécageuses, landes humides, marais tourbeux.</p>

	<p><b>Trèfle d'eau</b> <i>Menyanthes trifoliata</i>  <b>Bogbean</b>            Fleurs d'un blanc-rosé en grappe simple sur une hampe nue.            Avril-Mai-Juin.            Marécages et mares peu profondes.</p>
	<p><b>Sphaignes</b> <i>Sphagnum sp.</i>  <b>Peat or bog mosses</b>            Vert pâle à plus ou moins jaune.            Tige principale dressée qui n'arrête pas de grandir, tandis que la base se décompose et contribue à la formation de la tourbe et à l'acidité de la tourbière.            Sols tourbeux, tourbières.</p>
	<p><b>Potentille des marais ou Comaret</b> <i>Potentilla palustris</i>  <b>Marsh Cinquefoil or Swamp Cinquefoil</b>            Fleurs d'un rouge foncé, peu nombreuses.            Prairies humides, marécages, tourbières ; sur silice.            Juin-Août.</p>
	<p><b>Pédiculaire des marais</b> <i>Pedicularis palustris</i>  <b>Marsh Lousewort</b>            Fleurs roses ; en grappes feuillées.            Mai-Août.            Marécages, tourbières.</p>
	<p><b>Rhynchospore blanc</b> <i>Rhynchospora alba</i>  <b>White Beak-sedge</b>            Fleurs blanches.            Juin-Septembre            Marais et landes tourbeuses.</p>
	<p><b>Reine des prés</b> <i>Filipendula ulmaria</i>  <b>Meadowsweet</b>            Fleurs blanches, petites, parfumées.            Juin - août.            Bords des eaux, fossés, prairies humides.</p>